

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈皮膚軟化薬〉

販売名 ヒフル20DX

第3類医薬品

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと。

- (1)顔面、目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、脣等)等。
- (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4)炎症部位(ただれ、赤く腫れているところ)。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦する

用法・用量に関する注意

(1)定められた用法・用量を守ること。(2)小児(15歳未満)には使用させないこと。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。(4)外用にのみ使用すること。(5)本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないこと。(6)化粧品ではないので、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないこと。

成分・分量

(100g中)尿素 20.0g、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 0.5g、グリチルリチン酸一アンモニウム 0.5g、パンテノール 1.0g
添加物:ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸、ステアリルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ジメチルポリシリカサン、ジプロピレングリコール、D-ソルビトール、パラベン、エデト酸Na、グリシン、BHT、カルボキシビニルポリマー、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封したあとはなるべく早く使用すること。



万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

MADE IN JAPAN