


販売名:メディ ICH クリーム | 第2類医薬品



第2類医薬品

▲OPEN

販売名:メディ ICH クリーム 50g

【効能・効果】かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

【用法・用量】1日1~数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります。)

【成分・分量】(100g中)へパリン類似物質...0.3g、ジフェニドラミン...1.0g、グリチルリチン酸二カリウム...0.5g、トコフェロール酢酸エステル...0.5g、パンテノール...1.0g ●添加剤として、流動パラフィン、1,3-ブチレングリコール、セタノール、ハルミチン酸イソプロピル、モノステアリン酸ソルビタン、カルボキシビニルポリマー、2,2',2"-ニトリロリジンエタノール、エトド酸オトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトリエル、ポリルベート6.0、パラベン、香料

【発売元】株式会社I-ne

大阪市中央区南久宝寺町4-1-2 御堂筋ダイビル10F

【製造販売元】万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

【万協製薬(株)お客様相談窓口】

0598-30-5376 / 受付時間:10:00~17:00(土、日、祝日は除く)


〈副作用被害救済制度の問い合わせ先〉0120-149-931

MADE IN JAPAN

いつものスキンケアでは  
対応しきれない乾燥トラブルを治療

鎮める

グリチルリチン酸二カリウム  
ジフェニドラミン



肌の炎症を鎮める

修復


パンテノール  
トコフェロール酢酸エステル



血行を促進し、組織を修復

保湿

へパリン類似物質  
0.3%



肌のバリア機能を改善し潤いを与える

何度もくり返す  
乾燥・肌あれに

乾燥トラブル肌治療クリーム

うるおい  
保湿

MEDICAL FACE CREAM



鎮めたい肌荒れの赤み・ストレスによるかゆみにも

非ステロイド処方

第2類医薬品 | 販売名:メディ ICH クリーム

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この外箱の説明書きを必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。【使用上の注意】●してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)1. 次の人は使用しないこと(1) 出血性血液疾患(血小板減少症、紫斑病など)の人(2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長する可能性がある)(3) アトピー性皮膚炎の人(軽い症状であっても医師の下で適切な治療を受ける必要がある)●相談すること1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人(3) 湿潤やただれのひどい人(4) 医師からアトピー性皮膚炎と診断されたことのある人 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3.5~6日間使用しても症状がよくなる見込みがない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。【保管および取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因により品質が変わる)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

使用期限  
製造番号

A2602

