

二の腕などの気になるぷつぷつ・ざらざら肌に ユーラックミンウレア 35g

特徴

二の腕などのぷつぷつ・ざらざらは、毛穴周辺の古い角質が、部分的に厚くなって盛り上がっている状態です。

ユーラックミンウレアに含まれている角質軟化成分(尿素)が、角質に水分を与えてやわらかくし、血行促進成分(トコフェロール酢酸エステル)により、新陳代謝を高め、なめらかな肌へ改善します。また、抗炎症成分(グリチルリチン酸二カリウム)配合により、気になる赤みも改善します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、粘膜等
- (2) 引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位
- (3) かさぶたの様に皮ふがはがれているところ
- (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元 **ジャパンメディック株式会社**

富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107

受付時間月～金(祝祭日年末年始を除く) 9:00～17:00

副作用救済制度 ☎0120-149-931

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

皮ふ軟化薬

第3類医薬品

効能・効果

かさ肌、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、手指のあれ

用法・用量

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 化粧品ではありませんので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧品などの目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量(100g中)

尿素(ウレア) …………… 20g (硬くなった角質をやわらかくする)
トコフェロール酢酸エステル…0.5g (血行を促進し、新陳代謝を高める)
(ビタミンE酢酸エステル)
グリチルリチン酸二カリウム…0.5g (炎症を抑える)
添加物として、セトステアリルアルコール、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、ジメチルポリシロキサン、流動パラフィン、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、エデト酸Na、グリシン、塩化アンモニウム、リン酸水素Na、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、pH調整剤を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

1. 小児の手のとどかない所に保管してください。
2. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

気になる二の腕などのプツプツ肌・ザラザラ肌に

皮ふ軟化薬 ユーラックミンウレア 35g

特徴

二の腕などのプツプツ・ザラザラは、毛穴周辺の古い角質が、部分的に厚くなって盛り上がっている状態です。

ユーラックミンウレアに含まれている角質軟化成分(尿素)が、角質に水分を与えてやわらかくし、血行促進成分(トコフェロール酢酸エステル)により、新陳代謝を高め、なめらかな肌へ改善します。また、抗炎症成分(グリチルリチン酸二カリウム)配合により、気になる赤みも改善します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、粘膜等
- (2) 引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ) 部位
- (3) かさぶたの様に皮ふがはがれているところ
- (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元 **ジャパンメディック株式会社**

富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107

受付時間月～金(祝祭日年末年始を除く) 9:00～17:00

副作用救済制度 ☎0120-149-931

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

効能・効果

さめ肌、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、手指のあれ

用法・用量

1 日数回、適量を患部にすりこんでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 化粧品ではありませんので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧品などの目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量 (100g中)

尿素(ウレア)…………… 20g (硬くなった角質をやわらかくする)
トコフェロール酢酸エステル…0.5g (血行を促進し、新陳代謝を高める)
(ビタミンE酢酸エステル)
グリチルリチン酸二カリウム…0.5g (炎症を抑える)

添加物として、セトステアリルアルコール、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、ジメチルポリシロキサン、流動パラフィン、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、エデト酸Na、グリシン、塩化アンモニウム、リン酸水素Na、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、pH調整剤を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

1. 小児の手のとどかない所に保管してください。
2. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。