


ZZ90-4203T

1

0050-3069




しっとり、さっぱり  
べつつかない  
**MYLUCKMIN  
UREA CREAM**



**尿素20%配合**

**マイラックミンウレア<sup>®</sup>**  
82g **第3類医薬品**



**こんな肌にお使いください**

- 角質が厚くカチカチになった、ひじ、ひざ、かかとに
- 水分が不足し、カサカサになった手指のあれに
- 皮ふが乾燥し、ザラザラになったさめ肌



チューブタイプ

ご相談窓口  
マイクロウェバー株式会社  
☎ 03(3257)1150  
受付時間 10:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

発売元  
マイクロウェバー株式会社  
広島県三原市沼田西町小原  
200番地の76

製造販売元  
ジャパンメディック株式会社  
富山県富山市横越168



4 987754 104436

A1

第3類医薬品

尿素20%配合



**MYLUCKMIN  
UREA CREAM**

乾燥性皮ふ用薬  
マイラックミンウレア。

**第3類医薬品**

使用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。また、必要などきに読めるように大切に保管してください。

**△ 使用上の注意**

- してはいけないこと**  
[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]  
1. 次の部位には使用しないでください。  
(1) 目の周囲、粘膜等  
(2) 引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位  
(3) かさぶたの様に皮ふがはがれているところ  
(4) 炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)

- 相談すること**  
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮ふがはがれる

- 3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**○保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

**○効能・効果**

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

**○用法・用量**

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法を守ってください。
- (2) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

**○成分・分量(100g中)**

尿素(ウレア)……………20.0g  
 トコフェロール酢酸エステル…0.5g  
 (ビタミンE酢酸エステル)  
 グリチルリチン酸二カルシウム…0.5g  
 添加物:プロピレングリコール、グリセリン、セタノール、ステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、パラフィン、ワセリン、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸ポリオキシシル、ステアリン酸グリセリン、エドト酸Na、グリシン、塩化アンモニウム、パラベン、ジソプロパノールアミン

尿素(ウレア)	水分保持量増加作用により、硬くなった皮ふをやわらかくします。
ビタミンE	血行を改善し、荒れた皮ふの再生を助けます。
グリチルリチン酸二カルシウム	皮ふの炎症を抑えます。

ステロイド成分は配合しておりません

御用由事

台巻京簿

