

この添付文書は、使用の際には必ず読み、大切に保管してください。



管理コード
512102A1

皮膚軟化薬

EB・トレイル

第3類医薬品

◆こんな症状にお使いください

- お肌がザラザラしたり、ポツポツとしている方に
- 首元などの皮膚表面に古く黒ずんだ角質がある方に
- お肌の乾燥がすすみ、古い角質が溜まっている方に

角質除去

組織修復

黒ずんだ角質改善

炎症抑制

EB・トレイルは、有効成分が黒く古くなった角質を取り除くとともに、有効成分が肌の奥まで浸透して内側から保湿し、肌をなめらかに改善する、乾燥するお肌や角化症の治療薬です。首元やデコルテなどの皮膚がブツブツしたり、ポツポツするのは古い角質が溜まっている場合があります。乾燥が進み放置すると悪化することもあるため、EB・トレイルでの早めの対処をおすすめします。横腹周りや脇の下など全身にも使用していただけます。使用していただくことで、ポツポツの気にならない、すべすべのお肌に導きます。使用上の注意をよく読んでご使用ください。

【成分特徴】

●ポツポツ・ブツブツの原因である皮膚表面の黒く古くなった角質を、角質軟化成分(尿素)が柔らかくして取り除きやすくし、皮膚のポツポツを治し、滑らかなお肌に改善します。●血行を促進させることで(トコフェロール酢酸エステル)、新陳代謝を高め皮膚の生まれ変わりを活発にし組織修復を助けます。●炎症抑制効果(グリチルリチン酸二カリウム)により、皮膚の炎症を抑え赤みを改善します。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、粘膜等
- (2) ひっかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ) 部位
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ
- (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面も必ずお読みください。

【効能・効果】

さめ肌、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、手指のあれ

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

●用法・用量に関連する注意

- 1.定められた用法・用量をお守りください。
- 2.本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 3.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 4.外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

成分	分量(100g中)	はたらき
尿素	20g	硬くなった皮膚を潤す作用があり、角質を取り除く働きがあります。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.5g	血行を促進させ新陳代謝を高め、皮膚の再生を助けます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.5g	皮膚の炎症を抑えます。

添加物として、プロピレングリコール、グリセリン、セタノール、ステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、パラフィン、白色ワセリン、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸グリセリン、エドト酸Na、グリシン、塩化アンモニウム、パラベン、ジイソプロパノールアミンを含有します。

●保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ先

〈商品に関するお問合せ〉

☎ 0570-092-900

(受付時間 平日10:00~17:00)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931

発 売 元：

株式会社アルトルイズム

福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5 鶴田ビル7F

製造販売元:

ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168