

2018年12月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

皮膚軟化薬

第3類医薬品

シークイン

手指がかさかさする、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしが固くコチコチになる、水仕事などで肌がザラザラするといった症状は、皮膚表面の角質層の水分不足が原因です。

シークインは、「角質水分保有力増強作用」のある尿素20%を配合したクリームです。「かさかさ」「コチコチ」「ザラザラ」の皮膚を改善します。

〈シークインの特徴〉

- 20%の尿素が、体内から角質層へ適度の水分を取り込み、皮膚の水分バランスを保ちます。
- 親水性のクリーム剤ですので水で洗い流せます。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)
次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 引っかき傷の傷口、亀裂(ひびわれ)部位。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4) 炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬や化粧品などにより刺激症状又はアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態等

- 2週間使用しても症状がよくなる場合は

使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児(15歳未満)には使用させないでください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品などの目的で顔面には使用しないでください。
- (6) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

成分・分量

100g中

成分	分量
尿素	20g

添加物として、ステアリン酸ソルピタン、セタノール、流動パラフィン、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、パラベン、香料、その他4成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 配置期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、配置期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの配置販売業者又は下記までご連絡ください。

日本ゼトック株式会社

0120-886-440

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **日本ゼトック株式会社**
東京都新宿区西新宿1-26-2