

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

背中・脚など広い範囲のかゆい乾燥肌、乾燥によるゴワゴワに

# DHC かゆみを伴う乾燥性皮膚用乳状液

&lt;皮膚軟化薬&gt;

第3類医薬品

DHCかゆみを伴う乾燥性皮膚用乳状液は、乾燥肌のつらい症状に効果を発揮する治療薬。20%配合した尿素が、乾燥によりゴワゴワになった皮膚に水分を集め、やわらかくなめらかになります。また、繰り返しがちなかゆみや炎症を鎮める成分を配合。背中・脚などの広い範囲にもするするとのびる乳状液タイプです。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。(2)ひっかき傷等の傷口、亀裂(ひびわれ)部位。(3)炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)。(4)かさぶたのように皮膚がはがれている患部。



### 相談すること

1.次的人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状  |
|------|---|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、<br>かさぶたのように皮膚がはがれる状態 |

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■ 効能・効果

かゆみを伴う乾燥性皮膚(成人・老人の乾皮症)

40039 03J02

裏面も必ずお読みください。

## ■ 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

### 【用法・用量に関する注意】

- 1.用法・用量を守ってください。
- 2.15才未満の小児には使用させないでください。
- 3.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- 4.外用にのみ使用し、内服しないでください。
- 5.化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

## ■ 成分・分量

100g中

|              |       |       |
|--------------|-------|-------|
| 尿素           | ..... | 20.0g |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | ..... | 1.0g  |
| グリチルレチン酸     | ..... | 0.3g  |

添加物として、パラフィン、セタノール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、プロピレングリコール、パラベン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、スクワラン、トリエタノールアミンを含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- 1.本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- 2.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 3.小児の手の届かない所に保管してください。
- 4.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

医薬品  
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00~17:00(日・祝日のぞく)

DHC

製造販売元  
株式会社ディーエイチシー  
東京都港区南麻布2-7-1 ☎0120-333-906

DHCホームページ

パソコン <http://www.dhc.co.jp>  
携 帯 <http://www.dhc.jp>