

発毛促進ホルモン剤

ペレウス

20mL

塗布するだけで眉毛、恥部などの体毛の発毛を促進する発毛促進ホルモン剤です。無色透明な液剤で、べつつかず、さらりとした使用感です。

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) ご使用前に本剤を適量出し、内股などの皮ふのうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人
- (3) 15歳未満の小児
- (4) 妊婦、妊娠している可能性のある女性、授乳中の人
- (5) アンドロゲン依存性腫瘍(例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍(悪性))及びその疑いのある人
- (6) 排尿困難を伴う前立腺肥大のある人
- (7) 前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が2.0ng/mL以上の人(医師の判断に従うこと)
※本剤の有効成分(メチルテストステロン)は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。
- (a) 特に50歳以上の男性は前立腺腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。
- (b) 継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。
- (c) 検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師又は薬剤師に相談してください。
- (8) 睡眠時無呼吸症候群である人
- (9) 円形脱毛症の人

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔等)
- (2) 頭髪、まつ毛
- (3) 陰茎部先端(尿道口)、恥部の粘膜部
- (4) 外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位

3. 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないこと

- (1) ご使用後は石鹼とぬるま湯で手を十分に洗ってください。
- (2) 本剤を使用者以外の人に付着させないように注意してください。付着した場合は直ちに洗い流してください。
- (3) 塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹼とぬるま湯で十分に洗い流してください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 前立腺肥大症ではあるが、排尿困難を伴わない人
- (3) 本人又は家族が、薬や化粧品などによるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等)を起こしたことがある人
- (4) 重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧又はその既往歴のある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
恥部、腋窩(ワキの下)、眉	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等

(2) 月経異常又は、男性化の兆候があらわれた場合

3. 1~3カ月使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

4. 誤った使い方をしてしまった場合、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

眉毛脱毛、脇窩無毛、恥部無毛、薄毛

(まゆ毛・体毛の発毛促進に)

※頭髪へはご使用できません。

用法・用量

1日1~2回適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科医の診療を受けてください。
- (2) 内服しないでください。
- (3) 本剤の有効成分メチルテストステロンは男性ホルモンのため、頭皮には使用しないでください。

成分・分量

(100g中)

成分	含量	はたらき
メチルテストステロン	0.5g	毛母細胞に働きかけ、まゆ毛・体毛の発毛を促進します。

添加物としてグリセリン、エタノール、コレステロール、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない、なるべく涼しいところに密栓をして保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

火気厳禁：アルコール類 危険等級Ⅱ(エタノール)

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または
次のところにお問い合わせください。

協和新薬株式会社「お客様相談室」048-942-1445

受付時間 平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 三友薬品株式会社

大阪市東淀川区南江口3丁目1番51号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 0120-149-931

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

製造 協和新薬株式会社

販売元 埼玉県草加市小山1丁目28番8号