

ご使用前に必ずお読みください。また、必要時に読めるよう保管してください。

かゆみをともなう乾燥肌に
デオプランカ乳状液20
〈皮膚軟化薬〉

第3類医薬品

◆近年、エアコン等の普及によって部屋の空気が乾燥するようになりました。また、栄養のかたよりやストレス、外部刺激などのさまざまな要因から皮ふが乾燥してかゆみを生じることが増えてきました。デオプランカ乳状液20は、乾燥した肌に水分を保持する働きを持つ尿素、かゆみ止め成分のジフェニヒドラミン塩酸塩、炎症を鎮める成分グリチルレチン酸を配合した広くのびてべタつかない白色の乳液です。おやすみ前や外出時に使用してください。また、入浴後にぬると効果的です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 顔面、目の周囲、粘膜（例えば口腔、鼻腔、膣等）等。
- (2) 引っかき傷等の傷口、亀裂（ひび割れ）部位。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4) 炎症部位（ただれ、赤く腫れているところ）。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かゆみを伴う乾燥性皮膚（成人・老人の乾皮症）

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

<用法及び用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児（15才未満）には使用させないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

- (5) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
 (6) 化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量

(100g中)

成 分	分量	はたらき
尿素	20.0g	角質層に水分を取り込み保持する作用により、皮ふをしっとりなめらかにします。
ジフェンヒドラミン 塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、不快なかゆみやヒリヒリする感じを取り除きます。
グリチルレチン酸	0.3g	皮ふの炎症を鎮めます。


添加物として、パラフィン、セタノール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、プロピレンジコール、パラベン、流動パラフィン、ミリストチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、スクワラン、トリエタノールアミンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるものあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

日常生活で症状を悪化させないポイント

- 石けんをつけすぎず、こすりすぎない。入浴は熱すぎないように。
- 冷・暖房のつけすぎに注意。乾燥に気をつけましょう。



本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
万協製薬株式会社
 電話 0598-37-2088
 受付時間 AM10:00～PM5:00
 (ただし、土、日、祝祭日を除きます。)

発売元
摩耶堂製薬株式会社
 神戸市西区玉津町居住65-1
 製造販売元
万協製薬株式会社
 三重県多気郡多気町五桂1169-142