

華乃髪アップ

特徴

○女性の薄毛・抜け毛(壮年性脱毛症)に対して効果が認められた医薬品です。
○1回の使用量(1mL)を計量できる容器です。

○有効成分ミノキシジルが発毛を促進し、太くしっかりとした髪を育てます。

⚠ 使用上の注意

×してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)

1.次の人は使用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)未成年者(20歳未満)。

　国内での使用経験がありません。

(3)妊娠又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。

　妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。また、ミノキシジルは母乳中に移行します。

(4)妊娠、出産に伴い脱毛している人。

　壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。

(5)避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。

　壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。

(6)壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。

　本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。

(7)頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。

　男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

(8)脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。

　壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。

(9)頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。

　壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。

(10)男性。

　本剤は女性用の製品であるため、男性は使用しないでください。

2.次の部位には使用しないでください。

(1)本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。

　血圧が下がる等のおそれがあります。

(2)きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。

　きず等を悪化させることができます。

3.本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。

これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。

相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1)今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

(2)高血圧の人、低血圧の人。

　本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。

(3)心臓又は腎臓に障害のある人。

　本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。

(4)むくみのある人。

　むくみを増強させる可能性が考えられます。

(5)家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。

　壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。

(6)高齢者(65歳以上)。

　一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。

(7)次の診断を受けている人。

　甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。

　甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器	胸の痛み、心拍が速くなる
代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

* : 頭皮以外にあらわれることもあります。

3.6ヵ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)

[男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。]

4.使用開始後6ヵ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

頭頂部だけでなく側頭部や後頭部等の頭部全体の脱毛、頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等。

[男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。]

その他の注意

1.毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヵ月間、毎日使用してください。

本剤の有効性は6ヵ月間使用した場合に認められています。

2.毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。

3.効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。

本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。



用法・用量

成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

<注意>

(1)用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果は上がりません。定められた用法・用量を厳守してください。

(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります。)

(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。

(3)薬液のついた手で、目等の粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。

(4)髪の長い人は、髪を押し広げ、髪に薬液がつかぬよう、頭皮に丁寧に塗布してください。

(5)アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。

(6)整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。

(7)染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。

(8)つけ毛やヘアピースを着用の方は本剤を十分に乾燥させた後に装着してください。

成分・分量(100mL中)

成分	分量	はたらき
ミノキシジル	1.0g	発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。
パントテニールエチルエーテル	1.0g	毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な状態にします。
トコフェロール酢酸エステル	0.08g	皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。
l-メントール	0.3g	頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえます。

添加物:エタノール、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、pH調整剤

保管及び取扱い上の注意

(1)使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。

(4)火気につづけないでください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

連絡先：キューサイ株式会社

電話：通話料無料 0120-189-555

受付時間：月～金(土日祝除く)9時～18時

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

販売元

キューサイ株式会社

福岡県福岡市中央区薬院1-1-1

製造販売元

シオノケミカル株式会社

東京都中央区八重洲2丁目10番10号