


壮年性脱毛症における発毛剤

## ミノキシジル配合外用液5%「FCI」

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

## ＜効能・効果＞

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。  
ミノキシジル配合外用液5%「FCI」は、以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛に効果が  
あります。



緒方知三郎, 総合臨牀, 1953;2(1):101-106.

※脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。

成分	分量 (100mL中)	はたらき
ミノキシジル	5.00g	発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。
ピロキシリン塩酸塩	0.05g	過酸化物質やフケの発生の原因となる皮脂の過剰な分泌を抑制します。
トコフェロール酢酸エステル	0.08g	皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。
l-メントール	0.30g	頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえます。

添加物：エタノール、プロピレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、pH調整剤

## ＜用法・用量＞

成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布する。

## ＜用法・用量に関する注意＞

- 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。（決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります。）
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- 薬液のついた手で、目などの粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
- アルコールなどに溶けるおそれのあるもの（メガネわく、化学繊維等）にはつかないようにしてください。
- 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
- 染毛剤（ヘアカラー、毛染め、白髪染め等）を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。

## ▲ 使用上の注意

## ☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。）

## 1. 次の人は使用しないでください

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 女性。（本剤は日本人女性における安全性が確認されていません。）
- 未成年者（20歳未満）。（国内での使用経験がありません。）
- 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。（本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。）
- 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。（壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。）

## 2. 次の部位には使用しないでください

- 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。（血圧が下がる等のおそれがあります。）
- きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。（きず等を悪化させることがあります。）

## 3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください

（これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。）

## ■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
- 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
- 高血圧の人、低血圧の人。  
（本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。）
- 心臓又は腎臓に障害のある人。  
（本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。）
- むくみのある人。  
（むくみを増強させる可能性が考えられます。）
- 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。  
（壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。）
- 高齢者（65歳以上）。  
（一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。）
- 次の診断を受けている人。甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）。  
（甲状腺疾患による脱毛の可能性がります。）

- 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

関係部位	症状
皮膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器	胸の痛み、心拍が速くなる
代謝系	原因の分からない急激な体重増加、手足のむくみ

※頭皮以外にあらわれることもあります

- 6ヵ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。（太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。）  
（壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。）
- 使用開始後6ヵ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。  
（壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。）


## ■ その他の注意

- 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも4ヵ月間、毎日使用してください。（本剤の有効性は4ヵ月使用後から認められています。）
- 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
- 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。（本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。）

## <使い方>

1回量の1mLを、計量できるタイプの容器です。


1. 容器本体をたてにして、反時計回りにキャップを回し開けると、計量器先端に取り付けられた塗布ヘッドが引き上げられます。



### 注意

- 容器が逆さや斜めの状態でキャップを開閉しないでください。
- キャップは、ゆっくりと回してはずしてください。
- キャップをはずしたとき、塗布ヘッドが上がっていない場合には、もう一度キャップをしっかり閉め、同じ操作を行い、塗布ヘッドが上がっていることを確認してください。
- 塗布ヘッドは指で引き上げてください(故障の原因となります)。


2. 容器を逆さにして薬液が計量器に量り取られたことを確認し、頭皮に垂直に向け、塗布ヘッドで頭皮をタップするように素早く押し込みます。



### 注意

- 計量器に薬液が溜まったことを確認し、速やかに次の操作に進んでください。
- 容器をさかさのまま放置したり塗布ヘッドに触れたりすると、薬液が垂れることがあります。
- 塗布ヘッドが確実に押し込まれていないと、薬液が漏れ出すことがありますので、確実にしっかりと押し込んでください。

3. 塗布ヘッドで頭皮をタップし、計量器が空になるまで薬液を塗布します。



### 注意

- 塗布ヘッドで頭皮をタップして、計量器の薬液が無くなるまで塗布してください。
- 薬液が頭皮以外のところへ垂れないよう注意してご使用ください。

4. 使用後は容器を立てた状態でキャップをし、直射日光や高温・寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。  
キャップを開めたときカチッと音がしますが、これで閉まりきったわけではありませんので、手でしっかりと締めこんでください。

## <保管及び取扱い上の注意>

- (1) 使用後、キャップをして、直射日光や高温・寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

## <Q&A>

Q 壮年性脱毛症とはどのような脱毛症ですか？

A 壮年性脱毛症は、一般的に遺伝性の薄毛又は抜け毛で、何年もかけてゆっくりと進行します。通常、毛髪は数年かけて太くしっかりと成長しますが、壮年性脱毛症の方ではその成長期間が短くなってしまうため、細く短い毛になってしまいます。

Q ミノキシジル配合外用液5%「FCI」を使って、どのくらいで効果があらわれますか？

A ミノキシジル5%製剤では、4ヵ月使用後から有効性が認められています。効果には個人差があるため、全ての人に効果があるわけではありません。また、毛髪の成長には時間がかかります。そのため、6ヵ月間使用しても脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度のいずれも改善が認められない場合には、他の原因による脱毛症の可能性も考えられますので、医師又は薬剤師に相談してください。

Q 1日2回より多く使用しても良いですか？

A 1日2回より多く使ったり、1回の量を多くしても効果はあがりません。回数を増やす、塗布する量を増やすことにより、髪の成長が速くなることはほとんどなく、かえって副作用の発生リスクを上昇させるおそれがあります。1日2回、1回1mLの用法・用量を守って使用してください。

Q ミノキシジル配合外用液5%「FCI」の使用をやめたらどうなりますか？

A 効果を維持するには、継続して使用することが必要です。使用を中止すると、徐々に毛髪が元の状態に戻ります。

Q 整髪料を使用しても良いですか？

A 日常のヘアケア習慣を変える必要はありませんが、ミノキシジル配合外用液5%「FCI」の吸収を妨げないために、ミノキシジル配合外用液5%「FCI」の塗布後、十分に時間を空け、乾いてから整髪料等のヘアケア剤を使用してください。

お困りのことがあったら

お問い合わせ先: 富士化学工業株式会社  
学術担当  
TEL / 03-6453-0547  
受付時間 9:00~15:00  
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度の  
お問い合わせ先

0120-149-931  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

製造販売元



富士化学工業株式会社  
富山県中新川郡上市町郷柿沢1番地