

日本薬局方 第3類医薬品
オリブ油
火気注意
Olive Oil

【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】 皮膚の保護、日焼け炎症の防止、やけど、かぶれ

【用法用量】 ガーゼ、脱脂綿等に浸して皮膚（患部）に塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】 1mL中 日局オリブ油 1mL含有

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 10℃以下で、にごりやかたまりを生じることがありますが、品質に変わりなく、その場合は容器を温湯で温め、溶かしてから使用してください。

〈貯法〉

気密容器。室温保存。

【包装】 50mL、100mL、500mL

P

P

B

第3類医薬品

日本薬局方

オリブ油

火気注意

Olive Oil

500mL



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

皮膚の保護、かぶれに

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 脳	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能効果〕

皮膚の保護、日焼け炎症の防止、やけど、かぶれ

〔用法用量〕

ガーゼ、脱脂綿等に浸して皮膚（患部）に塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕

1 mL中
日局オリブ油 1 mL含有

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 10℃以下で、にごりやかたまりを生じることがありますが、品質に変わりなく、その場合は容器を温湯で温め、溶かしてから使用してください。

〔貯法〕

気密容器。室温保存。

第3類医薬品

日本薬局方

オリブ油



ガラス：瓶



キャップ：PP
パッキン：PE,PP