

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第3類医薬品

46

ハトムギ錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感、腹痛

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

排膿，利尿，鎮痛作用がある。

関節浮腫，皮膚のさめはだ，身体の疼痛（リュウマチ，神経痛），いぼ

〔用法・用量〕

食前1時間，又は空腹時，温湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	2～8錠	3回
7～13歳迄	1～4錠	

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕（本品100錠中）

日局	ヨクイニン末	22.5g
	自社製別紙規格	
日局	ヨクイニン（25.0g）より製した水性エキス	2.5g

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 直射日光をさけ，なるべく湿気の少ない，涼しい所に密栓して保管すること。
- 誤用をさけ，品質を保持するために，他の容器に入れかえないこと。
- 保存の状況が悪いと，場合によっては虫，カビ等がつくことが考えられますので，上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は，原料として天然の生薬を用いていますので，製品により多少色が異なったり，開栓後，吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが，効果には変わりありません。

【お問い合わせ先】

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3973-2917

○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10