

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

切り傷、やけど、ただれに

生薬製剤 **紫根の軟膏**

外皮用薬／販売名：リトスペール軟膏



紫根（シコン）は、古くから生薬、染料として用いられ、これを医薬品として利用した例の中でも有名なものには「紫雲膏（しうんこう）」という漢方製剤があります。リトスペール軟膏も同様に紫根を用いております。紫根とは読んで字の如し、ムラサキ属の“ムラサキ”という植物の根のことで、赤紫色をしています。これを成分とする本品も同じ色をしています。この色素が紫根中の主成分であるシコニン及びアセチルシコニンであり、皮膚創傷、火傷面の新生や肉芽形成に効果をあらわします。つまり、皮膚自身の治癒力を高めて助ける働きがありますので、切り傷、やけど、しもやけなどの症状改善を促進してくれます。



使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は使用しないでください

- （1）本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （2）湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。
- （3）傷口が化膿している人。
- （4）患部が広範囲の人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
・医師の治療を受けている人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

外科創傷(切り傷)、火傷(やけど)、一般潰瘍(ただれ)、凍傷(しもやけ)、
きれ痔

■ 用法・用量

本品を適宜患部に塗布する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

■ 成分・分量 (1,350g中)

紫根(シコン)	100g	} 抽出油……………	950g
ダイズ油	1,000g		
ミツロウ	……………		400g

生薬を原料として製造していますので、製品の色や固さ等に多少の差異を生じることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 軟膏が冷たくなりすぎるとチューブから出なくなる場合があります。その場合には、温かい場所に移してしばらくしてから使用してください。
- (5) 本剤は日時の経過とともに色調の変化が幾分見られますが、有効成分の効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

合名会社 東宝製薬 電話 058-251-6668 (代表)
受付時間 10:00~16:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **合名会社 東宝製薬**
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地