

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外皮用薬
非ステロイド剤

〈保湿・きずあと・やけどのあとに〉
ヒフルHPクリーム

第2類医薬品

ヘパリン類似物質の3つの効果

① 血行促進作用

血流の循環を良くして、皮膚の新陳代謝を促進します。

② 抗炎症作用

荒れた皮膚の症状を鎮めて、皮膚自身の持つ正常化機能を回復させます。

③ 保湿作用

乾燥皮膚の角質層内の水分量を増加させます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人

2. 次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3)湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

きず・やけどのあととの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのばして貼ってください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用してください。

※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなることがあります。)

※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し ●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。出してください。(①→②)



折り曲げないでください。 折りたまないでください。

【成分・分量】 100g中に次の成分を含みます。

成 分	分 量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	血行促進作用、抗炎症作用、保湿作用があります。

添加物としてセタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油50、グリセリン、プロピレングリコール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、エデト酸ナトリウム水和物、白色ワセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、スクワラン、トリエタノールアミンを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店または下記にお願い致します。
万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)

発売元
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>
製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142
B2603