

## 第3類医薬品

販売名 **リップベール**

口唇炎・口角炎治療薬

省資源化のため箱が添付文書を兼ねています。  
ご使用に際してこの箱の記載内容を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### ⚠ 使用上の注意

#### 📌 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 湿潤やただれのひどい人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

**効能・効果** 口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

**用法・用量** 1日数回、適量を患部に塗布してください。

#### 📌 用法・用量に関連する注意

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(3) 本剤は口唇への外用にのみ使用してください。(4) 小児が誤って口にした場合に、まず、口の中をふき取ってください。しばらく様子を見て異常がある場合には、医師に相談してください。

**成分・分量** 100g中

有効成分	分量
アラントイン	0.5g
パンテノール	0.5g
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.1g
グリチルレチン酸	0.3g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.2g
添加物：ワセリン、サラシミツロウ、グリセリン、モノステアリン酸グリセリン、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、ゲル化炭化水素	

**保管及び取り扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく早く使用してください。\*冬季など気温の低いときに中身が硬くなり、チューブから出にくくなることがあります。手で温めてからご使用ください。\*ご使用後は、チューブの口元をきれいにふいてください。

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電 話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00 (ただし、土、日、祝日は除きます。)