

商

標



皮膚病藥

家庭常備

別府

血池軟膏

〒874-0926 別府市京町1-13
製造販売元 (有) 福泉製薬所
〒874-0016 別府市亀川野田
発売所 血の池地獄

第3類医薬品

成分分量用法用量

一日じつ二回かい乃至ないし三回かい本剤ほんざいを患部かんぶの大小だいしやうにより
適宜てきぎ取出とりだし患部かんぶに指頭しとうにて塗擦とさつすべし
血ノ池地獄鉉泥 八、〇 イオウ 四、〇
モクタール 四、〇 黄色ワセリン 六、〇
内容量 二二g

税込金千三百円也

本品は赤茶色の軟膏です

効能

田虫たむし、水虫みずむし、しらくも
疥癬かいせん、霜やけしも、やけど
ひび、あかぎれ

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

製造番号



別府血ノ池軟膏説明書

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください

◎ 効能

たむし、みずむし、しらくも、疥癬、やけど、しもやけ、ひび、あかぎれ

◎ 用法用量

一日に二回乃至三回本剤を患部の大小により適宜に取り出し清潔な手指にて患部に患部よりやや広めにしていねいに塗擦してください

◎ 成分分量（内容量二十二g中）

- ◇ 血ノ池地獄鉱泥 八、〇
- ◇ イオウ 四、〇
- ◇ モクタル 四、〇
- ◇ 黄色ワセリン 六、〇

◎ 使用上の注意

してはいけないこと

- 一、次の人は使用しないでください
☆今までに、絆創膏や、湿布でかぶれたことのある人
☆本剤による過敏症（発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人

- 二、次の部位には使用しないでください

☆目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、外傷や化膿のひどい患部

相談すること

- 一、次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください

☆医師の治療を受けている人

☆乳幼児

☆本人または家族がアレルギー体質の人

☆薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

☆患部が顔面または広範囲の人

- 二、次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談してください

☆使用後、皮膚に、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、ただれ、水疱、刺激感等の症状があらわられた場合

☆二週間位使用しても症状がよくなるない場合

◎ 保管及び取扱上の注意

☆小児の手のとどかない所に保管してください

☆直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管してください

☆他の容器に入れ替えないでください

☆本品は赤茶色の軟膏です、衣類につくと落ちにくいのでご注意ください
☆寒冷時、硬くなりますが、暖めますと、やわらかく塗りやすくなります

〒八七四一〇九二六 別府市京町一番十三号

製造販売元(有)福泉製薬所

〒八七四一〇〇一六 別府市亀川野田

発売所 血の池地獄

第3類医薬品

電話〇九七七(六六)一一九一

◎本剤は血の池地獄の特産品ですので、他店で販売しておりません。

ご注文の際は血の池地獄宛で御願います。