

第3類医薬品 口唇炎・口角炎治療薬

レフシア Lip 10g



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

製造販売元  
ジャパンメディック株式会社  
富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107  
受付時間：月～金 9:00～17:00  
(祝祭日・年末年始を除く)

A2

副作用救済制度 ☎0120-149-931

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【効能・効果】

口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【成分・分量】(100g中)

アラントイン ..... 0.5g  
グリチルレチン酸 ..... 0.3g  
トコフェロール酢酸エステル  
(ビタミンE酢酸エステル) ..... 0.2g  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) ..... 0.1g  
パンテノール ..... 0.5g  
添加物として、流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、ワセリン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セタノール、硬化油、バラベンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。

※冬季など気温の低い時に中身が硬くなり、チューブから出にくくなることがあります。手で温めてからご使用ください。

※ご使用後は、チューブの口元をきれいにふいてください。