

minacolor

LIP

型紙口

【効能】効果】口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量】関連する注意】小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【成分・分量】1(g)中 アラントイン5mg / グリチルチン酸3mg / トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE酢酸エステル)2mg /

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)1mg / パンテノール5mg 添加物として、流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、ワセリン、

グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セタノール、硬化強、パラベンを含みます。

【保存および取扱】上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かないところに保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(使用の原因によって品質が変わります)

(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。

※冬季など気温の低いときに中身が硬くなりチューブから出にくくなる場合があります。手で温めてからご使用ください。

※ご使用後はチューブの口元をきれいにふいてください。

型紙口

販売所

ミナカラ薬局

製造販売元

ツヤバム・メダック・ツツ株式会社

高山市横越168

Made in Toyama, Japan.

ミナカラお客様相談窓口 ☎ 03-5544-8440

受付時間：9:00～18:00

副都庁教済制度 ☎ 0120-149-931

A1

紙



minacolor

← アフターフォロー - 詳しい製品情報



4 956622 110442

第3類医薬品

口唇炎・口角炎治療薬
クチピアLip 10gminacolor
ツヤバム・メダック・ツツ△ 使用上の注意
■ 相談すること

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が異なりますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
副作用

副作用	
副作用部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

