

第3類医薬品 □唇炎・□角炎治療薬

フィクテアLip 10g

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ステロイド無配合のクリームです

A1

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【効能・効果】

□唇のひびわれ、□唇のただれ、□唇炎、□角炎

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【成分・分量】(100g中)

アラントイン…………… 0.5g
グリチルレチン酸…………… 0.3g
トコフェロール酢酸エステル
(ビタミンE酢酸エステル)…………… 0.2g
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)…………… 0.1g
パンテノール…………… 0.5g
添加物として、流動パラフィン、マイクロクリスタリン
ワックス、ワセリン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エ
テル、セタノール、硬化油、パラベンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
また、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。
※冬季など気温の低い時に中身が硬くなり、チューブから出にくくなることがあります。手で温めてからご使用ください。
※ご使用後は、チューブの口元をきれいにふいてください。

口唇炎・口角炎

口唇炎・口角炎治療薬

フィクテアLip

内容量 10g 第3類医薬品

口唇のひびわれ・ただれ

ビタミン

E

フィクテアLip 内容量 10g

ビタミン

B6

医薬品のリップクリーム

- ・アラントイン
- ・グリチルレチン酸
- ・パンテノール 配合

第3類医薬品

5つの
有効成分
配合

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107

受付時間：月～金 9:00～17:00

(祝日・年末年始を除く)



口唇炎・口角炎治療薬

口唇炎・口角炎

口唇のひびわれ・ただれ

