



オリブ油

第3類医薬品

60mL



日本薬局方

オリブ油

第3類医薬品

60mL

火気注意

使用に際してこのケースの説明文をよくお読み下さい。
また、必要ときに読めるよう大切に保管して下さい。

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

皮膚の保護、日焼け炎症の防止、やけど、かぶれ

【用法・用量】

ガーゼ、脱脂綿等に浸して皮膚(患部)に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

【成分・分量】

本品1mL中 日局オリブ油1mL 含有。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (2) 使用後は密栓し、火気をさけて保管すること。
- (3) 10℃以下で、にごりやかたまりを生じるが、品質に変わりなく、その場合は容器を温湯で温め、溶かしてから使用すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【お問合せ先】

丸石製薬株式会社 学術情報グループ
大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL. 0120-014-561

副作用被害救済制度

☎0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造番号
使用期限



製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

発売元
 **丸石製薬株式会社**
大阪市鶴見区今津中2-4-2