

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

目薬

第2類医薬品

アイガン

アイガンは、目の充血をおさえるナファゾリン塩酸塩や抗ヒスタミン薬のクロルフェニラミンマレイン酸塩、炎症をしずめるアラントインなどを配合し、清涼感のあるソフトなさし心地で、目の疲れや結膜充血、目のかすみなどにすぐれた効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
(4)次の診断を受けた人。
緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)目のかすみが改善されない場合。
(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法・用量】

1日5～6回、1回2～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。容器の先が、まぶたやまつ毛に触れますと、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがありますので、注意してください。また、混濁したものは、使用しないでください。
- 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとってください。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用のみ使用してください。

裏面もよくお読みください。

【成分・分量】

100mL中

成 分	分 量
アラントイン	100mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg
ナファゾリン塩酸塩	3mg
硫酸亜鉛水和物	50mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg

添加物として、ホウ酸、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコール、トメントール、d-ボルネオールを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

**■お問い合わせ先**

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貫 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)