

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

点眼薬
目の疲れ・目のかすみ・目のかゆみ

アナロンゴールド目薬

第2類医薬品

私たちの日常の生活環境において、何かと目に負担をかけることが多くなっています。特に最近コンピューターやOA機器の普及により、ディスプレイ（テレビ）などを長時間見るようになりました。また、排気ガスなどの空気の汚れで目に刺激を受けやすくなっております。

アナロンゴールド目薬は、活性型ビタミンB₂であるフラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム（FAD）、さらにタウリンをはじめ各種成分の働きにより、目のかすみ、目の疲れ、光線による眼炎などの諸症状に効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人。
緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 目のかすみ改善されない場合。
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効 能

目のかすみ（目やにの多いときなど）、目の疲れ、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回2～3滴、1日4～6回点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
(目やにや雑菌等のため、薬液が汚染することがあります。)
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



成分・分量 100mL中

成分名	分量	作用
クロルフェニラミン マレイン酸塩	10mg	紫外線などの光線の刺激によりおこる目やにやただれ目に効果があります。
タウリン	100mg	目の粘膜の代謝を促し、目に栄養を与えます。
ナファゾリン塩酸塩	3mg	目の疲れや外部からの刺激による目の充血を取ります。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	100mg	目の粘膜の代謝を促し、目に栄養を与えます。
フラビンアデニン ジヌクレオチドナトリウム (活性型ビタミンB ₂)	30mg	体内で利用されやすい活性型のビタミンB ₂ で、新陳代謝を活発にして低下した目のはたらきを改善します。

添加物：ホウ酸、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、アルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na水和物、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、*l*-メントール、*d*-ボルネオール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
(目の病気にかかっている人が使用している目薬を他の人が使用した場合、その目薬をとおして感染することがあります。)
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封後はできるかぎり早く使用してください。又、混濁したものは使用しないでください。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：058-278-3933
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

本社所在地

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鷗1丁目139番地
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号