

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。  
また、必要な時にお読みになれるように大切に保管して下さい。

# 身延 久遠水

15 mL

目薬

第2類医薬品

## 目の疲れ・かすみ・充血に

最近の生活環境は、わたし達の目に何かと負担をかけることが多くなってきています。テレビ、車の運転、OA機器の使用、そして一步外に出れば、ホコリや強い日差しなど毎日の生活の中で知らず知らずのうちに目を酷使し、目の疲れや、充血などの症状が多くなって来ています。「身延 久遠水」は各種の症状に対しそれぞれに効果を発揮する複数の有効成分を配合した複合型点眼薬です。

「身延 久遠水」を2～3滴点眼すると目にスーッと爽快感がひろがります。



### 【使用上の注意】



#### 相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
  - 次の診断を受けた人  
緑内障
- 使用后、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 目のかすみが改善されない場合
  - 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

### 【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量、成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧下さい。

## 【用法・用量】

1回2～3滴，1日3～6回点眼してください。

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 過度に使用すると，異常なまぶしさを感じたり，かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には，保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先が，まぶたやまつ毛などに触れると，目やにや雑菌などのため，薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また，混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズの装着液として，またソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 本剤は，点眼用にのみ使用してください。

## 【成分・分量】

有効成分	含有量(100 mL中)	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	3 mg	血管収縮作用により，結膜(白目の部分)の充血を取り除きます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10 mg	抗アレルギー作用により，目のかゆみを抑え，目のかすみ(目やにの多いときなど)を解消します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	300 mg	角膜の保水性を高め，栄養補給を促進し，異物感，目の疲れを改善します。

添加物として塩化 Na，リン酸水素 Na，リン酸二水素 Na，ホウ酸，ℓ-メントール，クロロブタノール，エチルパラベン，プロピルパラベンを含有しています。

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。  
特に車のダッシュボード等，高温下に放置すると，容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また，使用期限内であっても，開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 保存状態によっては，成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には，清潔なガーゼで軽くふきとってから使用してください。

### お問い合わせ先

佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口  
住 所：佐賀県三養基郡基山町小倉 481  
電 話：0942-92-5656 (代表)  
受付時間：午前 9:00～午後 5:00 (土，日，祝日を除く)

発売元 **クオン薬局**

〒409-2524 山梨県南巨摩郡身延町身延 3718

製造販売元 **佐賀製薬株式会社**

〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉 481