

ご使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時にすぐに読めるよう大切に保管してください

第2類医薬品

とてもつらい疲れ目・充血に11の有効成分が効く

アイクリスタ11

めまぐるしく進化する情報化社会では、パソコン、携帯電話、テレビ、新聞、雑誌等から、目を通して情報を吸収する機会が極めて多くなっています。また、目は常にホコリ、花粉やハウスダスト等の外的要因にさらされています。

その結果、ピント調節機能の低下、目の疲れ、かすみ、充血、かゆみ、炎症等を訴える人が老若男女問わず増加し続けています。アイクリスタ11はネオスチグミンメチル硫酸塩、3種類のビタミン類、3種類のアミノ酸類によるピント調節機能回復、目の疲れの改善をはじめ、抗炎症、抗ヒスタミン効果により、目のかゆみ、充血を改善します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人：緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 目のかすみが改善されない場合
 - 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

- (3)容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので、注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)本剤は、点眼用のみ使用してください。

成分・分量

有効成分	含有量 (10.0mL中)	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能の低下を改善し、目の疲れを和らげます。
ビタミンB ₁₂ (シアノコバラミン)	20mg	毛様体筋の働きを活発にし、目の疲れを改善します。
ビタミンB ₆ (ピリドキシン硫酸塩)	50mg	角膜細胞の新陳代謝を促進し、目の疲労回復に有効です。
パンテノール (ビタミンB群)	50mg	活発な新陳代謝に必要な栄養成分として働き、目を守ります。
L-アスパラギン酸マグネシウム ・カリウム(等量混合物)	1000mg	アミノ酸の一種で、目の細胞呼吸の活性化とともに栄養を与え、目の疲れを癒します。
タウリン	1000mg	目に栄養を与えるとともに代謝改善作用が傷んだ目の組織修復を助けます。
コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	250mg	角膜を保護し、目に潤いを与え、栄養補給を促進します。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により目のかゆみをやわらげます。
塩酸テトラヒドロゾリン	30mg	末梢血管収縮作用により、結膜(白目の部分)の充血を取り除きます。
イブシロン-アミノカブロン酸	1000mg	炎症の原因となる物質(プラスミン)の産生を抑え、炎症症状を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	250mg	炎症による目のかゆみ、まぶたのただれなどの症状を鎮めます。

添加物としてホウ酸、エト酸Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、クロロブタノール、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、*d*-カンフルを含有しています。

<成分・分量に関連する注意>

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分であるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異状によるものではありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります)。
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6)保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には、清潔なガーゼで軽くふきとってから使用してください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記までお願い申し上げます。

お問い合わせ先: 佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口

電話: 0942-92-5656

受付時間: 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 佐賀製薬株式会社 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481