

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。
また、必要な時にお読みになれるように大切に保管して下さい。


第3類医薬品 ～目の疲れ・目のかすみ（目やにの多いときなど）に～

マリンクリア40

15mL
眼科用薬

近頃、パソコン、テレビ、ゲームや携帯電話などの急速な普及により、私たちの目はさまざまなストレスを受けています。こうした機器（VDT:端末表示機器/Visual Display Terminal）の画面を長時間凝視することによって起こる、目や身体の不調がVDT症候群です。目に関する症状としては「目の疲れ、目のかすみ、目の乾きや視力の低下を感じる」などがあげられます。特に目の疲れはピント調節をつかさどる毛様体筋が疲労し、うまく機能しなくなることが主な原因です。

「マリンクリア40」は毛様体筋に直接働きかけて目のコリをほぐすネオスチグミンメチル硫酸塩をはじめ、ビタミン類やアミノ酸類などの7つの有効成分を配合し、目の疲れや目のかすみなどの症状をやわらげ、目をリフレッシュしてくれる点眼薬です。



マリンクリア40 点眼イメージ

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
 - はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人
 - 緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 目のかすみが改善されない場合
 - 2週間位使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量、成分、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

【用法・用量】

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やに雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 本剤は、点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量】

有効成分	含有量 (100 mL中)	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5 mg	毛様体筋のピント調節機能低下を改善し、目の疲れをやわらげます。
グリチルリチン酸二カリウム	250 mg	炎症による目のかゆみ、まぶたのただれなどの症状を改善します。
ピリドキシン塩酸塩〔ビタミンB ₆ 〕	50 mg	角膜細胞の新陳代謝を促進し、目の疲労回復に有効です。
トコフェロール酢酸エステル〔ビタミンE〕	25 mg	血行改善作用により、目への栄養補給が促され、疲れた目の回復を助けます。
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)	1000 mg	アミノ酸の一種で、目の細胞呼吸活性化とともに栄養を与え、目の疲れを癒します。
タウリン	500 mg	目に栄養をあたえるとともに代謝改善作用がいたんだ目の組織修復を助けます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	250 mg	角膜を保護し、目にうるおいをあたえ、栄養補給を促進します。

添加物としてエデト酸ナトリウム水和物、ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、グリセリン、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物液、ポリソルベート80を含有しています。

【成分・分量に関する注意】

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。

環境問題に配慮し、携帯袋は採用しておりませんので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口

住 所：佐賀県三養基郡基山町小倉481

電 話：0942-92-5656

受付時間：午前9：00～午後5：00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先 ☎0120-149-931

製造販売元 佐賀製薬株式会社
佐賀県三養基郡基山町小倉481