

ご使用に際し、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時にお読みになれるように大切に保管してください。



第2類医薬品

ピュアリッチAG点眼薬

15mL

眼科用薬

最近の生活環境は、知らず知らずのうちに目に負担をかけることが多くなっており、目のかゆみ、目の疲れ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)等の様々な症状を引き起こしています。ピュアリッチAG点眼薬は、目の炎症やかゆみをしずめるクロルフェニラミンマレイン酸塩、結膜充血を抑える塩酸テトラヒドロゾリンなど各種の症状に対し効果を発揮する6つの有効成分を配合した点眼薬です。

使用上の注意



相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人:はげしい目の痛み。
 - 次の診断を受けた人:緑内障。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ
- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 目のかすみが改善されない場合。
 - 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)。

用法・用量、成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

用法・用量

1回2～3滴, 1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると, 異常なまぶしさを感じたり, かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先が, まぶたやまつ毛などに触れると, 目やにや雑菌などのため, 薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また, 混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用에만使用してください。

成分・分量

有効成分	分量	はたらき
塩酸テトラヒドロゾリン	0.05%	末梢血管収縮作用により, 目の充血を緩和します。
イプシロン-アミノカプロン酸	1.00%	炎症の原因となる物質(プラスミン)の産生を抑え, 炎症の症状を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%	生薬由来成分で炎症による目のかゆみ, まぶたのただれなどの症状を鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	抗ヒスタミン作用により目のかゆみをやわらげます。
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)	1.00%	アミノ酸の一種で, 目の細胞呼吸の活性化とともに栄養を与え, 目の疲れを癒やします。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.50%	角膜を保護し, 目に潤いを与え, 栄養補給を促進します。

添加物としてホウ酸, ホウ砂, ℓ -メントール, クロロブタノール, メチルパラベン, プロピルパラベンを含有しています。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は点眼後, ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので, 品質などの異常によるものではありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等, 高温下に放置すると, 容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり, 品質が変わることがあります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また, 使用期限内であっても, 開封後はできるだけ速やかに使用してください。開封後, 長く放置すると濁りや変質のおそれがありますので, 注意してください。
- (6) 保存状態によっては, 成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってから使用してください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは, お買い求めの薬局・薬店, 又は下記までお願い申し上げます。

佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口

電話: **0942-92-5656** 受付時間: 午前9:00～午後5:00(土, 日, 祝日を除く)

企画元: **株式会社ツルハグループマーチャンダイジング** 製造販売元 **佐賀製薬株式会社**

〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481