

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時にすぐに読めるよう大切に保管してください

第2類医薬品

ベルロビンプレミアム

- ・抗炎症作用を持つベルベリン硫酸塩水和物とグリチルリチン酸二カリウムの二つの生薬由来成分を配合しています。
- ・「ベルロビンプレミアム」は9種類の有効成分を全て最大濃度[※]配合した目薬です。
※一般用眼科用薬製造販売承認基準の最大濃度配合

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人：緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。

- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
 (5)点眼用にのみ使用してください。

成分・分量

有効成分	含有量 (100mL中)	はたらき
塩酸テトラヒドロソリン	50 mg	末梢血管収縮作用により、結膜(白目の部分)の充血を取り除きます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5 mg	ピント調節機能の低下を改善し、目の疲れを和らげます。
ベルベリン硫酸塩水和物	25 mg	炎症による目のかゆみ、まぶたのただれなどの症状を鎮めます。
グリチルリチン酸二カルウム	250 mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30 mg	抗ヒスタミン作用により目のかゆみをやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100 mg	角膜細胞の新陳代謝を促進し、目の疲労回復に有効です。
バンテノール(ビタミンB群)	100 mg	活発な新陳代謝に必要な栄養成分として働き、目を守ります。
L-アスパラギン酸マグネシウム・カルウム(等量混合物)	2000 mg	アミノ酸の一種で、目の細胞呼吸の活性化とともに栄養を与え、目の疲れを癒やします。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	500 mg	角膜を保護し、目に潤いを与え、栄養補給を促進します。

添加物としてエデト酸ナトリウム水和物、ホウ酸、ホウ砂、d-ボルネオール、ℓ-メントール、塩化ナトリウム、クロロブタノール、プロピルバラベン、メチルバラベンを含有しています。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に苦味または甘味を感じることがあります。これは本剤が涙道を通して口中に流れ出て、含有成分であるベルベリン硫酸塩水和物およびグリチルリチン酸二カルウムにより感じるものであり、品質などの異常ではなく、健康上問題はありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってから使用してください。
- (7) 本点眼薬の液色は生薬由来成分「ベルベリン硫酸塩水和物」の色です。点眼の際、衣服などにつけないよう、十分ご注意ください。また、点眼される際には、ティッシュを目の下に当ててお使いになることをお勧めします。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記までお願い申し上げます。

お問い合わせ先: 佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口

電話: 0942-92-5656

受付時間: 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 佐賀製薬株式会社 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481