



2013年6月 記載要領変更に伴う改訂

**第3類
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



点眼薬

目の疲れ・目のかすみに

ノール ワイド[®]

疲れ目に効くビタミンB₁₂
ピント調整成分配合

ノールワイドは…

- 目の調節機能、代謝機能を高め、目のかすみや疲れに効果をあらわすネオスチグミンメチル硫酸塩、L-アスパラギン酸マグネシウムカリウム(等量混合物)を配合しています。
- 視神経の働きを整え、目の疲れに効果をあらわすビタミンB₁₂、B₆を配合しています。
- さわやかで清涼感のあるピンク色の澄明な目薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人。
緑内障



2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 目のかすみが改善されない場合。
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。


キャップの開閉方法

必ずキャップを上にして容器の角を持って開けてください。

●開け方


キャップを手前にひねってください。

(容器の中心を押さえたまま開けると薬液がとびだすことがあります。)



●閉め方

カチッと音がするまで押し下げてください。



〔効 能〕

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

〔用法・用量〕

1日3~6回、1回2~3滴ずつ点眼します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕15mL中

成 分	分 量	働 き
ビタミン B ₁₂	3mg	視神経の働きを整え新陳代謝を促進し、目の疲れに効果をあらわします。
ビタミン B ₆	15mg	
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.3mg	目の調節機能、代謝機能の働きを整え、目の疲れに効果をあらわします。
L-アスパラギン酸マグネシウム カリウム(等量混合物)	300mg	
クロルフェニラミン マレイン酸塩	3mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギーによる目のかゆみ、充血を抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	15mg	結膜充血、紫外線などによる目の炎症、まぶたのただれに効果をあらわします。

添加物として、*l*-メントール、*d*-カンフル、ゲラニオール、ポリソルベート80、ホウ酸、ホウ砂、クロロブタノール、アルコール、pH調整剤を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の点眼後、口中に甘味を感じるがありますが、これは本剤に含まれるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に伝わってくるため、ご心配ありません。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光や蛍光灯の光に当たらないようにして、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
(ビタミンB₁₂は光に当たると分解して退色します。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は速やかにご使用ください。
- (6)温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中(ダッシュボード等)や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。
- (7)本剤は、ピンク色の目薬ですので、衣服につかないように注意してください。もし衣服についたときは、すぐに水で洗い流していただければシミになりません。
- (8)容器のネジ部に成分の赤い結晶がつくことがありますが、このような場合には清潔なガーゼなどでふき取ってから使用してください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号