



# sato

## セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

**第2類  
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



**眼科用薬**  
眼疲労・かすみ目・充血・眼病予防に

# ノアール<sup>®</sup>12EX

ノアール12EXは…

- 一般用眼科用薬承認基準最大数の12種類の有効成分が入った目薬です。
- 目の使いすぎによる眼疲労の回復などに効果をあらわします。
- さわやかなさしごこちの、オレンジ色の澄明な目薬です。



**使用上の注意**



**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。  
緑内障



2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

**【効 能】**

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

**【用法・用量】**

1日3～6回、1回1～3滴 点眼します。

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 点眼用にのみ使用してください。

★裏面につづく



〔成分・分量と働き〕15mL中

成分	分量	働き
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.75mg	目の調節機能、代謝機能の働きを整え、目の疲れに効果をあらわします。
ビタミン B <sub>12</sub> (シアノコバラミン)	0.75mg	視神経の働きを整え、新陳代謝を促進し、目の疲れに効果をあらわします。
ビタミン B <sub>6</sub> (ピリドキシン塩酸塩)	4.5mg	
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	7.5mg	末梢血管の血流をよくして目の疲れを改善します。
L-アスパラギン酸カリウム	150mg	眼組織の新陳代謝を整え、目の疲れに効果をあらわします。
タウリン	75mg	
クロルフェニラミン マレイン酸塩	4.5mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみ、充血を抑えます。
塩酸テトラヒドロゾリン	7.5mg	結膜充血を改善します。
イプシロン-アミノカプロン酸	150mg	抗プラスミン作用により、目の炎症を抑えます。
ベルベリン塩化物水和物	1.5mg	炎症による目のかゆみ、まぶたのただれなどの症状を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	30mg	結膜充血・紫外線などによる目の炎症、まぶたのただれに効果をあらわします。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	37.5mg	角膜の表面を保護し、眼病予防に効果をあらわします。

添加物として、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸ナトリウム水和物、l-メントール、dl-カンフル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ホウ酸、pH調節剤を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の点眼後、口中に甘味を感じることがありますが、これは本剤に含まれるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に伝わってくるため、ご心配ありません。

◎保管及び取扱い上の注意

- 直射日光や蛍光灯の光に当たらないようにして、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。  
(ビタミンB<sub>12</sub>は光に当たると分解して退色します。)
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は速やかにご使用ください。
- 温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中(ダッシュボード等)や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。
- 本剤は、オレンジ色の目薬ですので、衣服につかないように注意してください。もし衣服についたときは、すぐに中性洗剤を使用して洗ってください。
- 容器のネジ部に成分の結晶がつくことがありますが、このような場合には清潔なガーゼなどでふき取ってから使用してください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号