

2014年3月改訂
(用法用量変更に伴う改訂)
2012年12月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)

この説明書は、お薬とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。



目の疲れ・充血に 第2類医薬品
サンテザイオン®
眼科薬

目を酷使する機会が多くなると、毛様体(レンズの役割を果たす水晶体の厚みを調節)が疲労して、目の疲れなどの不快感が現れます。

サンテザイオンは、毛様体の末梢神経に働いて、毛様体筋のはたらきを活発にするビタミンB12(シアノコバラミン)、眼組織の炎症を鎮めるグリチルリチン酸二カリウムなどを配合し、目の疲れ・充血に効果を発揮します。また、穏やかなさし心地とともに7種類の有効成分が目に広がります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
 ・ はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
 ・ 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

● 次の注意事項をお守りください。

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



裏面につづく

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

成分・分量

成 分	分 量	はたらき
ビタミンB12(シアノコバラミン)	0.02%	毛様体筋のはたらきを活発にし、目の疲れを改善します。
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩)	0.1%	目の組織代謝を活発にします。
ナファゾリン塩酸塩	0.002%	結膜(白目の部分)の充血を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.01%	ヒスタミンの働きを抑え、目の炎症・目のかゆみを抑えます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.002%	ピント調節機能改善作用により、目の疲れなどを改善します。
タウリン	0.1%	目の組織代謝を活発にします。
グリチルリチン酸二カリウム	0.1%	目の炎症を抑えます。

添加物として、アミノカプロン酸、クロロブタノール、ゲラニオール、ベンザルコニウム塩化物液、ホウ酸、d-カンフル、l-メントール、等張化剤、pH調節剤を含有します。

〈成分・分量に関する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通って口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に赤くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。
- (7)本剤の赤い色はビタミンB12(シアノコバラミン)の色です。点眼中に薬液がこぼれてシャツなどが着色した場合は、すぐに水洗いしてください。

包 装 15mL

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」 電話番号 0120-127-023
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)

お問い合わせ内容の正確性を期すため、また回答の質の維持・向上のため、お電話を録音させていただいております。