

この説明書は、お薬とともに保管し、  
使用の際には、よくお読みください。

Santen

目の疲れ、目の乾き、目のかすみに  
裸眼にも、コンタクトにも

第1類医薬品

日本薬局方 精製ヒアルロン酸ナトリウム点眼液

# ヒアレイン<sup>®</sup>S 眼科薬

ヒアレインSは涙の不安定さなどからくる「目の疲れ」「目の乾き」「目のかすみ」に効く目薬です。目の酷使や乾燥などによって、目の表面の涙の層に凹凸ができると、ものがかすんだように見づらくなり、さらに「目の疲れ」などの不快な症状を引き起こします。ヒアレインSに含まれる有効成分ヒアルロン酸ナトリウムは高い保水機能をもっており、目にうるおいを与え「目の疲れ」「目の乾き」「目のかすみ」などの不快な症状を改善します。

ヒアレインSはカラーコンタクトレンズをのぞく  
すべてのコンタクトレンズ装着中に使えます。

ソフト

O<sub>2</sub>

ハード

使い捨て  
(ディスポザブル)

コンタクトレンズを装着していない方もご使用いただけます。  
※ソフトコンタクトレンズを装着したままでは使用できない目薬も  
ありますので、外箱や添付文書をよく確認しましょう。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の診断を受けた人:ドライアイ、シェーグレン症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群、角膜感染症
- (3) 次の症状のある人:急な視力低下、はげしい目の痛み(病状が悪化する恐れがありますので、自己判断で治療をすることなく医師の診療を受けてください)



### 相談すること

1. 次の人は**使用前**に医師または薬剤師にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 目の症状以外に、次の症状がある人
    - ・口の乾燥、鼻腔の乾燥
    - ・高熱、唇のただれ、のどの痛み、皮ふの広範囲の発疹・発赤などの持続や急激な悪化
  - (4) 次の診断を受けた人:緑内障
2. **使用后**、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み、刺激感、異物感、目やに

3. 次の場合は**使用を中止し**、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください。
  - (1) 目のかすみが改善されない場合
  - (2) 用法・用量に従い1週間くらい使用(1本目を使い切る目安)しても症状がよくなる場合や、何らかの異常が感じられた場合(2本目を使用する前にご相談ください)
4. 症状の改善が見られても、**2週間を超えて使用する場合は**、医師または薬剤師にご相談ください。

## 効能・効果

目の次の症状の緩和：乾き、異物感(コロコロ・チクチクする感じ)、疲れ、かすみ、ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## 用法・用量

1回1滴、1日5～6回点眼してください。

### ●次の注意事項をお守りください。

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります)また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)点眼用のみ使用してください。
- (4)カラーコンタクトレンズの装着時は、使用しないでください。

## 開栓方法

肩口にとどく  
までまわすと…



点眼口にアナが  
あきます。




## 成分・分量

成分	分量
精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%

添加物として、アミノカプロン酸、エデト酸ナトリウム水和物、クロルヘキシジングルコン酸塩液、等張化剤、pH調節剤を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)使用するまでは、キャップをねじ込まないでください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (5)他の人と共用しないでください。
- (6)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開栓後はできるだけ速やかに使用してください。
- (7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。



[自然環境に配慮し、携帯袋は添付しておりません。ご理解の程お願い申し上げます。]

## お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」

電話番号 0120-127-023

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ内容の正確性を期すため、また回答の質の維持・向上のため、お電話を録音させていただいております。