

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

目の疲れ・充血に

第2類医薬品

新ラスター[®]目薬

1. 目の疲れを改善します。

ビタミンB6の新陳代謝促進作用が、目の動きを活発にし、疲れた目の機能回復を助けます。

2. 目のかゆみや充血を除きます。

クロルフェニラミンマレイン酸塩が炎症の原因となるヒスタミンの働きを抑え、目のかゆみや充血を除きます。

3. 眼病を予防します。

コンドロイチン硫酸エステルナトリウムは角膜の透明性を保ち、表層を保護することにより目に潤いを与え、眼病も予防します。

4. クールなさしごちです。

疲れた目にクールな清涼感を与えます。



目の疲れ



結膜充血



目のかゆみ

⚠ 使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

<用法用量に関連する注意>

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。(目やにやその他異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがあります。)また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6)点眼用のみ使用して下さい。



容器の先が目やまつ毛に触れないようにして下さい。

【成分分量】


100mL中

成分	分量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、結膜充血を取り去ります。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	15mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	100mg	目の新陳代謝を促進し、目の疲れや眼病予防に効果的に働きます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	300mg	目の乾燥を防ぎ、眼病を予防します。

添加物として l-メントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)使用期限(外箱に記載)の過ぎた商品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話：(0748) 88-3180 (大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

