

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

第3類医薬品

眼病予防・結膜充血に ラスター[®]こどもソフト

- お子様の目はデリケートです。ゴミやほこり、花粉が原因で思わぬトラブルを引き起こすことがあります。ラスターこどもソフトは、傷ついた目の組織の修復を助け、眼病を予防します。
- テレビゲームやパソコンで目を酷使うことによって起こる目の疲れ、結膜充血等の症状にも効果があります。
- 抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや炎症をしずめます。
- 水泳後の目をやさしくケアします。
- 目にしみないソフトなさし心地の目薬です。



眼病予防



結膜充血



目のかゆみ

⚠ 使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
 - はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人
 - 緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【用法用量】

15才未満 1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5)点眼用にのみ使用して下さい。



容器の先が目やまつ毛に触れないようにして下さい。

【成分分量】


100mL中

成分	分量	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	1mg	疲れた目のピント調節機能を改善します。
イブシロン-アミノカプロン酸	1000mg	充血や目の炎症をしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をやわらげます。
L-アスパラギン酸カリウム	200mg	新陳代謝を促進して、目の働きを正常に保ちます。
タウリン	1000mg	傷ついた目の組織修復を助け、眼病を予防します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg	目の乾燥を防ぎ、眼病を予防します。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の期限内にご使用下さい。
(使用期限の範囲内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。)
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用下さい。



■お問い合わせ先
滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話：(0748) 88-3180 (大代表)
受付時間：9時から17時まで (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879