

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

△目薬△ 第3類医薬品

日 朝 水

目は身体の中で大切な部分で、精密でデリケートな器官です。毎日の生活の中で、現代人の目は、テレビ、排気ガス、車の運転、細菌や紫外線などさまざまな刺激にさらされています。目を酷使すると目が疲れたり、目に炎症がおこると赤く充血したり、目のかすみなどの症状があらわれます。このような時、日朝水が効果的にはたらき、それらの症状を取り除きます。

【作用と特徴】

- 一、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)は、目に栄養を与えて、疲れ目などの症状を改善します。
- 二、クロルフェニラミンマレイン酸塩の抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をやわらげます。
- 三、硫酸亜鉛水和物の收れん作用により、目の炎症を鎮めます。
- 四、コンドロイチン硫酸エステルナトリウムは、傷つきやすい角膜を保護します。
- 五、さわやかなさし心地の目薬です。

⚠ 使用上の注意

■【相談すること】

一、次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (一) 医師の治療を受けている人
- (二) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (三) 次の症状のある人
　　・はげしい目の痛み
- (四) 次の診断を受けた人
　　・緑内障

二、使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

三、次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (一) 目のかすみが改善されない場合
- (二) 二週間位使用しても症状がよくならない場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入つたときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法用量】

一回1～3滴、一日3～6回点眼して下さい。

（用法用量に関する注意）

- (一) 用法用量を厳守して下さい。
- (二) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (三) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (四) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (五) 点眼用にのみ使用して下さい。

【成分分量】（1ml中）

ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）	1・○
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1・五 mg
硫酸亜鉛水和物	一・五 mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	三・○ mg
添加物としてホウ酸、ホウ砂、L-メントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、クロロブタノール、パラベン、プロピレンゲリコールを含有します。	

【保管及び取扱い上の注意】

- (一) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近くなど40℃以上になる場所に放置しないで下さい。（高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。）
- (二) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (三)(四) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になつたり品質が変わります。）
- (五)(六) 他人の人と共用しないで下さい。
使用期限の経過した製品は使用しないで下さい。（使用期限の範囲内であつても、開封後はなるべく早くご使用下さい。）
保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとつてご使用下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社

くすり相談室

電話（〇七四八）八八一三一八〇（大代表）

受付時間

九時から十七時まで

（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

電話〇一二〇一一四九一九三二

（フリーダイヤル）

販売元
覚林房

〒四〇九一五二四

山梨県南巨摩郡身延町身延三五一〇

電話（〇五五六）六二一〇〇一四

FAX（〇五五六）六二一〇〇四五五

<https://kakurinbo.jp>

発売元
日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田一十九

製造販売元
滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝八七九