

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

第2類医薬品

疲れ目・充血・かゆみに ラスタゴールD[®]12

● つらい疲れ目をやわらげます。

情報社会において、現代人の目は酷使され続けています。働きすぎた目の疲れに12種類の有効成分がすぐれた効果を発揮します。

● 6つの有効成分を基準※内最大量配合

充血を抑える塩酸テトラヒドロゾリン、目のかゆみを鎮めるクロルフェニラミンマレイン酸塩、炎症を抑えるグリチルリチン酸二カリウム、ピント調節機能を改善するネオスチグミンメチル硫酸塩とシアノコバラミン、組織代謝促進作用のあるタウリンを基準※内最大濃度配合。

※基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲

● さし心地さわやかな赤色澄明の目薬です。

⚠ 使用上の注意



■ 【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人
緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1) 目のかすみ改善されない場合
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

<用法用量に関連する注意>

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (4)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。(目やにやその他異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがあります。)また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6)点眼用에만使用して下さい。



容器の先が目やまつ毛に触れないようにして下さい。

【成分分量】

100mL中

成分	分量	はたらき
塩酸テトラヒドロソリン	50mg	目の充血を抑えます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
アラントイン	100mg	充血や目の炎症を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	250mg	目の炎症を抑えます。
硫酸亜鉛水和物	50mg	紫外線等による目の炎症を鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血を鎮めます。
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	20mg	視神経の働きを整え、目の疲れをやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg	組織代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
パンテノール	50mg	組織代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	1000mg	組織代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
タウリン	1000mg	傷ついた目の組織修復を助け、眼病を予防します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	250mg	角膜の表面を保護し、目の乾燥を防ぎます。

添加物として L-メントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、クエン酸Na、クエン酸、ホウ酸、エデト酸Na、パラベン、クロロブタノール、プロピレングリコールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)使用期限(外箱に記載)の過ぎた商品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用下さい。
- (7)本剤の赤い色はシアノコバラミンの色です。点眼時、衣服等につかないように注意して下さい。もし衣服等についた場合は、すぐに水で洗い流して下さい。



■お問い合わせ先
滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話：(0748) 88-3180 (大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

