

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

目のかゆみ・目の充血

第2類医薬品

アルシン[®]AG

目は常に外界と接しているため、アレルギー性の症状を起こしやすい器官のひとつです。特に近年、自然や生活環境の変化にとまぬい、花粉やハウスダスト（室内塵）等が原因で起こるアレルギー性の目のかゆみ、結膜充血といった症状を訴える人があります。

アルシンAG は、このような目のかゆみや充血を効果的に改善します。さらに、爽やかなさしごこちで、目に清涼感を与えます。



⚠ 使用上の注意



【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人
緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - 目のかすみが改善されない場合
 - 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6) 点眼用にのみ使用して下さい。



【成分分量】


100mL中

成分	分量	作用
ナファゾリン塩酸塩	2mg	目の刺激や疲れに伴う結膜充血を取り去ります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をやわらげます。
グリチルリチン酸二カリウム	50mg	炎症を抑え、抗アレルギー作用があります。
アラントイン	100mg	目の傷やただれを修復します。
タウリン	500mg	炎症によって損傷した目の組織修復を助けます。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、塩化Na、l-メントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、パラベン、クロロブタノール、エデト酸Na、ポリソルベート80を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えしないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話：(0748) 88-3180 (大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879