ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

目の充血・目のかゆみ 第2類医薬品

アルシン・レッド

パソコン・携帯電話でのメール交換や車の運転などで、目を 使う機会がとても多くなっています。 このようなとき、「アルシンレッド」の有効成分が目に栄養を 補給し、目の疲れにすぐれた効果を発揮します。

目のかゆみや充血を除きます。

クロルフェニラミンマレイン酸塩が炎症の原因となるヒスタ こンの働きを抑え、目のかゆみを除きます。また、ナファゾ リン塩酸塩の血管収縮作用により結膜の充血を除きます。

目の疲れを改善します。

視神経に作用するビタミンB12と目の新陳代謝を促進する ビタミンB6が、目の働きを活発にし、目の疲れなどを 効果的に改善します。



結膜充血



目のかゆみ



目の疲れ

使用上の注意

【相談すること】

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して 下さい
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3)次の症状のある人 はげしい目の痛み
 - (4)次の診断を受けた人 緑内障
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある ので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
1 1	充血、かゆみ、はれ

- 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談して下さい
 - (1)目のかすみが改善されない場合
 - (2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入った ときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(ま ぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、 目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【用法用量】

1回1~3滴、1日3~6回点眼して下さい。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、 かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督 のもとに使用させて下さい。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6) 点眼用にのみ使用して下さい。



容器の先が目やまつ毛に 触れないようにして下さい。

【成分分量】

100mL中

成 分	分量	作用用
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、結膜の充血 を取り去ります。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	10mg	抗ヒスタミン作用により、目の かゆみや充血をやわらげます。
シアノコバラミン (ビタミンB12)	10mg	視神経の働きを整え、目の疲 れ等に効果があります。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	100mg	目の新陳代謝を促進し、目の疲れ や眼病予防に効果的に働きます。
タウリン	300mg	傷ついた目の組織修復を助け、 眼病を予防します。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	300mg	目の乾燥を防ぎ、眼病を予防します。

添加物として lーメントール、dーボルネオール、ゲラニオール、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、パラベン、プロピレングリコールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管 して下さい。特に車中・暖房器具の近くなど 40℃以上になる場所に放置しないで下さい。 (高温の所に放置すると、容器が変形したり品質 に影響するおそれがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の期限内にご使用下さい。





■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話:(0748)88-3180(大代表)

受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (独) 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町滝879