

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

第3類医薬品

つらい目の疲れやかすみに^{*}

※目やにの多いときなどによる

ラスター[®]40ゴールド

ラスター40ゴールドは、血行促進作用・抗酸化作用をもつビタミンEや目の新陳代謝を活発にするビタミンB6・パンテノール・タウリン、ピント調節をスムーズにするネオスチグミンメチル硫酸塩等を配合し、目の疲れや目のかすみに効果があるさし心地さわやかな目薬です。



使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
　　はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人
　　緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

【効能効果】

目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ

【用法用量】

1回1~3滴、1日3~6回点眼して下さい。

<用法用量に関する注意>

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。(目やにやその他の異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがあります。)また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5)点眼用にのみ使用して下さい。



【成分分量】


100mL中

成 分	分 量	はたらき
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	50mg	血行改善作用により、目への栄養補給をたすけます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	50mg	新陳代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
パンテノール (ビタミンB群)	50mg	角膜の組織代謝を促して、目の疲れの回復を早めます。
タウリン	1000mg	傷ついた目の組織修復をたすけ、眼病を予防します。
コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	100mg	目の乾燥を防ぎ、眼病を予防します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
イブシロン-アミノカプロン酸	1000mg	アレルギー等による目の炎症をしめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をやわらげます。

添加物としてホウ酸、塩化Na、l-メントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)使用期限(外箱に記載)の過ぎた商品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話:(0748) 88-3180(大代表)
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879