

## 目薬

第2類医薬品

疲れた瞳リフレッシュ！スーパークールなさし心地

## ラスタークールプロ®



●つらい疲れ目に  
ピント調節機能  
改善成分配合



●充血・炎症をケア  
充血除去成分や  
炎症を抑える  
成分を配合

●最高レベルの清涼感 ※

清涼感レベル

※当社目薬中

弱 ← 1 2 3 4 → 5+++ 強



## 使用上の注意

## 【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人  
　　はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人  
　　緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

## 【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

## 【用法用量】

1回1~3滴、1日3~6回点眼して下さい。

### <用法用量に関する注意>

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。(目やにやその他異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがあります。)また、混濁したもののは使用しないで下さい。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6)点眼用にのみ使用して下さい。



## 【成分分量】

100mL中

成 分	分 量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、結膜充血をおさえます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
硫酸亜鉛水和物	100mg	紫外線等による目の炎症をしめます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	100mg	新陳代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	10mg	血行改善作用により、目への栄養補給をたすけます。
コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	500mg	目の乾燥を防ぎ、眼病を予防します。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、l-メントール、d-カンフル、ユーカリ油、エデト酸Na、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。  
(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)使用期限(外箱に記載)の過ぎた商品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用下さい。



### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話 : (0748) 88-3180 (大代表)

受付時間 : 9時から17時まで (土、日、祝日を除く)

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

 滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879