



ゼリア新薬

瞳にやさしい差し心地 ビュークリアロツソ

第2類医薬品

眼科用薬

〔特徴〕

- ビュークリアロツソは、日頃からパソコンや携帯電話などで目を使い過ぎている方の疲れ目や目の充血に効果を示す赤色の目薬です。
- 刺激を抑えたやさしい差し心地で、目を守ります。
- 瞳にやさしい高分子保存剤を採用しました。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4)次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)5～6日間位使用しても症状がよくなる場合。

〔効能・効果〕

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

〔用法・用量〕

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用のみ使用してください。
- (6)液色は成分の色です。点眼時、衣服等につかないように注意してください。もし衣服等へついたときは、直ぐに水で洗い流してください。

(必ず裏面もお読みください)

〔成分〕

成分	分量	はたらき
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	0.02%	ピント調節作用により、目の疲れなどを改善します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	0.1%	目に栄養を与え、新陳代謝を活発にします。
アラントイン	0.1%	組織修復作用により、目に生じた傷やただれを治します。
塩酸テトラヒドロソリン	0.025%	拡張した血管を収縮させ、目の充血を取り除きます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.01%	抗ヒスタミン剤で、アレルギー性の目のかゆみを抑えます。

添加物：エデト酸ナトリウム水和物、塩化ポリドロニウム、ホウ酸、トメントール、d-ボルネオール、ポリソルベート80、エタノール、等張化剤、pH調節剤

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00～17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

ビュークリアはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

J11N
ビュークリアロソ