

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



ゼリア新薬

目の疲れ・かすみ目に サフィオ®Z12

眼科用薬

【特徴】

- サフィオZ12は、目を酷使用する人のつらい疲れ目やかすみ目（目やにの多いときなど）等に効果を発揮する眼科用薬です。
- 12種類の有効成分（うち5種類が最大量配合*）が、目のピント調節や代謝促進、角膜保護や抗炎症に働き、目のつらい諸症状を緩和します。
- スキッとした清涼感のある無色透明の点眼薬です。



*一般用眼科用薬製造販売承認基準内最大濃度



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
(4)次の診断を受けた人。
緑内障
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ |
3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)目のかすみが改善されない場合。
(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

【用法・用量】

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

（用法・用量に関連する注意）

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用のみ使用してください。
- (6)定められた用法・用量を守ってください。

（必ず裏面もお読みください）

〔成分〕

| 成分 | 分量 | はたらき |
|-------------------------|--------|-------------------------------------|
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | 0.005% | ピント調節作用により、目の疲れなどを改善します。 |
| イプシロン-アミノカプロン酸 | 1.0% | 抗炎症作用により、目の炎症をします。 |
| グリチルリチン酸二カリウム | 0.1% | 局所の炎症をします、目のかゆみを抑えます。 |
| 硫酸亜鉛水和物 | 0.05% | 収れん作用により、目の炎症を抑えます。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 0.03% | 抗ヒスタミン作用により、アレルギー症状の目のかゆみ・充血を緩和します。 |
| 塩酸テトラヒドロソリン | 0.05% | 拡張した血管を収縮させ、目の充血を取り除きます。 |
| ピリドキシン塩酸塩 | 0.05% | 新陳代謝を活発にして目の疲れを改善します。 |
| パンテノール | 0.1% | |
| 酢酸 d- α -トコフェロール | 0.025% | |
| トリアスパラギン酸カリウム | 1.0% | |
| タウリン | 0.5% | |
| コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 0.1% | 角膜の乾燥を防いで、目を保護します。 |

添加物：エデト酸ナトリウム水和物、トメントール、 α -ボルネオール、塩化カリウム、塩化ナトリウム、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、エタノール、プロピレングリコール、ポリソルベート 80、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 60、pH調節剤 2 成分

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

サフィオはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11