

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるように大切に保管すること。

点眼薬

目のかすみ・疲れに

マイティア® フレッシュ40

第3類医薬品

販売名 マイティアフレッシュ40

特徴

- ネオスチグミンメチル硫酸塩のピント調節機能改善作用、L-アスパラギン酸カリウムの瞳に酸素を取り入れる作用、天然型ビタミンEの血行を良くする作用により、目のかすみ※・疲れに効果をあらわします。
- アラントインの組織修復作用、クロルフェニラミンマレイン酸塩の抗ヒスタミン作用により、目のかゆみ・充血などに効果的です。
- 清涼感があり、すっきり爽やかなさし心地。
- 無色澄明の目薬です。

ネオスチグミンメチル硫酸塩
ピント調節機能を改善

L-アスパラギン酸カリウム
瞳に酸素をとり入れる

天然型ビタミンE
血行を良くする

目のかすみ※・疲れなどに、
すぐれた効果を発揮します。

※目やにの多いときなど

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
緑内障
 - (4) 次の診断を受けた人。
緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、刺激感

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 目のかすみ改善されない場合
 - (2) 2週間使用しても症状がよくなる場合

効 能

目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回2～3滴を1日5～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)容器の先を目、まぶた、まつ毛に触れさせないこと(目やにやその他異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがある)。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- (4)点眼用のみ使用すること。
- (5)用法・用量を厳守すること。



容器の先が目、まぶた、まつ毛に
ふれないように

成分 1mL中


成分	含量
酢酸d- α -トコフェロール	0.5mg
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.05mg
パンテノール	1mg

成分	含量
L-アスパラギン酸カリウム	10mg
アラントイン	1mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.3mg

添加物：*l*-メントール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、L-グルタミン酸ナトリウム水和物、d-ボルネオール、マクロゴール4000、塩化ナトリウム、pH調節剤

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないこと。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4)容器に他のものを入れて使用しないこと。
- (5)他の人と共用しないこと。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
また、使用期限内であっても、内袋開封後はすみやかに使用すること。
- (7)保存の状態によっては、容器の先周囲やキャップの内側に薬液中の成分の結晶が付くことがある。このような場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用すること。



容量 15mL

本製品内容についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
千寿製薬株式会社「お客様インフォメーション」
〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目1番9号
電話 0120-078-552 受付時間：9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **千寿製薬株式会社**
大阪市中央区瓦町三丁目1番9号