

2012年1月（記載要領変更に伴う改訂）

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

第2類
医薬品

目の疲れ、充血に バラード目薬V

点眼薬

抗炎症成分グリチルリチン酸二カリウム配合

バラード目薬Vは目におだやかな栄養補給を行い、目の疲れ、充血などにすばやい効果を発揮する5つの有効成分を配合。スッキリとしたさしごちの、目にやさしい目薬です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

〔用法・用量〕

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用에만使用してください。

〔効能・効果〕

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）。

〔成分・分量〕

成分	分量 (100mL中)	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、目の充血を取り除きます。
グリチルリチン酸二カリウム	100mg	抗アレルギー作用・抗炎症作用により、紫外線による眼炎や眼瞼炎の炎症を鎮め、また目のかゆみを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	15mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性の目のかゆみ・炎症を抑えます。
タウリン	100mg	目の新陳代謝を盛んにし、目の不快な諸症状の回復を早めます。
エンドロイジン酸エステルナトリウム	70mg	角膜の乾燥を防止し、目のうるおいを保ちます。

添加物：ホウ酸、ホウ砂、ベンザルコニウム塩化物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ℓ-メントール、d-ボルネオール

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、配置期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼやティッシュ等で軽くふき取って使用してください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
 東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室
 〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10
 電話：076-478-5580
 受付時間：9:00～16:00（土、日、祝祭日を除く）

製造販売元 **TOA 東亜薬品株式会社**
 富山県富山市水橋開発277番10