

2012年1月（記載要領変更に伴う改訂）

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

第3類
医薬品

目の疲れ、充血に バラード目薬OA

点眼薬

シアノコバラミン（ビタミンB₁₂）配合

バラード目薬OAは、目の神経機能を回復させる赤いビタミンB₁₂をはじめ、目の組織代謝を活発にして眼病予防に役立つビタミンB₆など5つの有効成分を配合。現代人の目の疲れや眼病予防に最適な目薬です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
・ はげしい目の痛み
・ 充血
・ 緑内障
- (4) 次の診断を受けた人。
・ 非難性牛乳斑症

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

〔用法・用量〕

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

〔用法・用量に関する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。

〔効能・効果〕

目の疲れ、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、結膜充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感。

〔成分・分量〕

成 分	分 量 (100mL中)	は た ら き
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	20mg	視神經に作用して、目の調節機能を改善し、目の疲れ、かすみ目を改善します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	100mg	目の代謝機能を活発にして、疲れ目などの症状の回復を早めます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	毛様体筋に作用して、目の調節機能を高め、目の疲れ、かすみ目を改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	20mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性の目のかゆみ・炎症を抑えます。
タウリン	200mg	目の新陳代謝を盛んにし、目の不快な症状の回復を早めます。

添加物：ホウ酸、ホウ砂、パラベン、クロロブタノール、d-ボルネオール、l-メントール

〈成分・分量に関する注意〉

本剤の赤い色は成分のシアノコバラミン(ビタミンB₁₂)の色です。点眼の際に衣服についても水洗いすればしみは残りません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)本剤は光によって変色しますので、密栓して必ず添付のしゃ光袋に入れ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、配置期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に赤くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼやティッシュ等で軽くふき取って使用してください。

〔量用・呑用〕

（参考）アトロビン眼液（10ml中）含有量：10mg

（意在する量用・呑用）

アトロビン眼液（10ml中）含有量：10mg

アトロビン眼液（10ml中）含有量：10mg

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室

〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10

電話：076-478-5580

受付時間：9:00～16:00（土、日、祝祭日を除く）

製造販売元 **TOA 東亜薬品株式会社**
富山県富山市水橋開発277番10