

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

目の疲れ・かすみ・充血に

ルイビーR 目薬 15mL

最近では生活環境の変化に伴い、テレビ、OA機器、パソコン、情報誌、スポーツ、車の運転など、日常生活においてあまりにも目を酷使しています。そのため、目がつかれる、目がかすみ、目が充血する、などの症状を訴える方が増えています。

ルイビーRは、これらの症状を解消し、爽やかな清涼感を与えてくれる、現代生活にマッチした、ツイストキャップ装備の目薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ


3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみ改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

(効能・効果)

目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

●目を酷使するこんな方におすすめします。



(用法・用量)



1日5～6回、1回2～3滴ずつ点眼してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 過度に使用しますと、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので、定められた用法・用量をよく守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
容器の先がまぶたやまつ毛に触れますと、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用してください。
- (5)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。(一旦レンズをはずしてから点眼してください)
- (6)本剤は、点眼用にのみ使用してください。

(キャップの開閉方法)



(正しい点眼方法)

中栓が目やまつ毛に
ふれないように点眼
してください。



(成分・分量)

成分・分量	配合成分の働き
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂) 0.005%	遠近調節を行う毛様体の働きを活発にして、目の疲れを改善します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆) 0.100%	目に栄養を与え、細胞の代謝を促進して目の働きを正常にする働きがあります。
ナファゾリン塩酸塩 0.002%	血管を収縮させ、目の充血を除去します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.001%	目の調節機能を活発にし、目の疲れ、目のかすみを回復させる働きをします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.010%	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみを抑えます。
タウリン 0.500%	目に栄養を与え、細胞の代謝を促して、炎症によって損傷した目の組織修復を助けます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 0.200%	角膜を保護する働きと、薬の効き目を長く持続させる働きがあります。
添加物として、ホウ酸、ホウ砂、 <i>l</i> -メントール、 <i>d</i> -ボルネオール、クロロブタノール、パラベンを含有する。	



(保管及び取り扱い上の注意)

- (1)使用後はキャップをしっかり締めて、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限 (外箱に書いてあります) の過ぎたものは、使用しないでください。
- (6)開封後はなるべく早く (2ヶ月以内に) 使用してください。

★本剤の赤い色は成分のシアノコバラミン (ビタミンB₁₂) の色です。点眼の際に衣服についても水洗いをすればシミは残りません。



(お客様相談窓口)

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

キョーリンリメディオ株式会社 学術部

〒920-0017 金沢市諸江町下丁287番地1

☎ 0120-960189

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)