

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

第3類医薬品

目のかすみ・目のつかれに

ノイプラス40DX 目薬 15mL

細かい作業や読書をしていて、目が疲れる、目がかすむ、物がダブって見える、頭が痛くなる、根気が無い—このような状態を眼精疲労と言います。

眼精疲労の原因にはいろいろありますが、最も多いのは歳をとるとともに目の調節機能が衰えて近くのものにピントが合わなくなることによるものです。

ノイプラス40DXは天然型ビタミンEにビタミンB₆、B₁₂等を配合した目薬で、中高年から始まる「目の疲れ」、「目のかすみ」などの症状に優れた効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみ改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

(効能・効果)

目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

(用法・用量)


1日5～6回、1回2～3滴ずつ点眼してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
容器の先がまぶたやまつ毛に触れますと、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。（一旦レンズははずしてから点眼してください）
- (5) 本剤は、点眼用에만使用してください。

(正しい点眼方法)

中栓が目やまつ毛に
ふれないように点眼
してください。



(成分・分量)

成分・分量	配合成分の働き
酢酸 d - α -トコフェロール (天然型ビタミンE)…………… 0.050%	末梢血管の血液の流れを良くし、目に栄養を与える働きを促進します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩 …………… 0.005%	目の調節機能を活発にし、目の疲れ、目のかすみを回復させる働きをします。
タウリン…………… 1.000%	目に栄養を与え、細胞の代謝を促して、炎症によって損傷した目の組織修復を助けます。
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂) …………… 0.010%	遠近調節を行う毛様体の働きを活発にして、目のつかれを改善します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆) …………… 0.050%	目に栄養を与え、細胞の代謝を促進して、目の働きを正常にする働きがあります。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム …………… 0.100%	角膜を保護する働きと、薬の効き目を長く持続させる働きがあります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩 …………… 0.030%	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみを抑えます。
イプシロン-アミノカプロン酸 …………… 1.000%	炎症をしずめ、不快な症状を取り去ります。
添加物として、ホウ酸、エデト酸ナトリウム水和物、 l -メントール、 d -ボルネオール、クロプタノール、ベンザルコニウム塩化物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調節剤を含有する。	

(保管及び取り扱い上の注意)

- (1)使用後はキャップをしっかり締めて、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
 - (2)小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
 - (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
 - (5)使用期限 (外箱に書いてあります) の過ぎたものは、使用しないでください。
 - (6)開封後はなるべく早く (2ヶ月以内に) 使用してください。
- ★本剤の赤い色は成分のシアノコバラミン (ビタミンB₁₂) の色です。
点眼の際に衣服についても水洗いをすればシミは残りません。

(お客様相談窓口)

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

キョーリンリメディオ株式会社 学術部
〒920-0017 金沢市諸江町下丁287番地1

☎ 0120-960189

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)