

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

目の疲れ・かすみ・充血に

# セルメディカR 目薬 15mL

s e l m e d i c a

最近では生活環境の変化に伴い、テレビ、OA機器、パソコン、情報誌、スポーツ、車の運転など、日常生活においてあまりにも目を酷使しています。そのため、目がつかれる、目がかすむ、目が充血する、などの症状を訴える方が増えています。

セルメディカRは、これらの症状を解消し、爽やかな清涼感を与えてくれる、現代生活にマッチした、ツイストキャップ装備の目薬です。

## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人。

はげしい目の痛み

(4)次の診断を受けた人。

緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

## (効能・効果)

目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

●目を酷使するこんな方におすすめします。



## (用法・用量)

1日5～6回、1回2～3滴ずつ点眼してください。

## (用法・用量に関連する注意)

- (1)過度に使用しますと、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので、定められた用法・用量をよく守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
容器の先がまぶたやまつ毛に触れますと、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用してください。
- (5)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。  
(一旦レンズをはずしてから点眼してください)
- (6)本剤は、点眼用にのみ使用してください。

### (キャップの開閉方法)

キャップのあけ方      キャップのしめ方



キャップを手前にひねってください。



カチツと音がするまで押し下げてください。

- ◎必ずキャップを上にして、容器の側面をしっかり持ってあげてください。
- ◎容器の中心をおさえたまま開封すると、薬液のもれ、液だれの原因になることがあります。

### (正しい点眼方法)



中栓が目やまつ毛にふれないように点眼してください。

### (成分・分量)

成分・分量	配合成分の働き
シアノコバラミン (ビタミンB <sub>12</sub> ) 0.005%	遠近調節を行う毛様体の働きを活発にして、目の疲れを改善します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> ) 0.100%	目に栄養を与え、細胞の代謝を促進して目の働きを正常にする働きがあります。
ナファゾリン塩酸塩 0.002%	血管を取縮させ、目の充血を除去します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.001%	目の調節機能を活発にし、目の疲れ、目のかすみを回復させる働きをします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.010%	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみを抑えます。
タウリン 0.500%	目に栄養を与え、細胞の代謝を促して、炎症によって損傷した目の組織修復を助けます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 0.200%	角膜を保護する働きと、薬の効き目を長く持続させる働きがあります。
添加物として、ホウ酸、ホウ砂、 <i>l</i> -メントール、 <i>d</i> -ボルネオール、クロロブタノール、パラベンを含有する。	



### (保管及び取り扱い上の注意)

- (1)使用後はキャップをしっかり締めて、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
  - (2)小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3)誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えしないでください。
  - (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
  - (5)使用期限(外箱に書いてあります)の過ぎたものは、使用しないでください。
  - (6)開封後はなるべく早く(2ヶ月以内に)使用してください。
- ★本剤の赤い色は成分のシアノコバラミン(ビタミンB<sub>12</sub>)の色です。点眼の際に衣服についても水洗いをすればシミは残りません。



### (お客様相談窓口)

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

キョーリンリメディオ株式会社 学術部

〒920-0017 金沢市諸江町下丁287番地1

☎ 0120-960189

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **グレートアンドグランド株式会社**

製造販売元 **キョーリンリメディオ株式会社**

富山県南砺市井波885番地