

muhi

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類
医薬品

眼科用薬

ムヒ®のこども目薬 こどもアイスパー®

販売名: こどもアイスパー

こどもアイスパーは、お子さまの生活習慣に合うよう、目のかゆみや炎症をおさえ、目のつかれをやわらげる成分をバランス良く配合した、すぐれた効きめの目にやさしいお子さま用目薬です。

お子さまの目は、長時間のゲームやテレビ、読書や勉強などで、つかれやすい環境にあります。また、水泳や、屋外でのスポーツ、遊びなどで目に小さな傷や炎症を起こすことがあります。

日頃から、お子さまの生活や環境に気をつけて、かわいい目を大切に守ってあげてください。

特 長

- 目のかゆみや炎症をおさえ、充血をしずめます。
- 水泳のあとの眼病予防に適しています。
- 目のつかれにすぐれた効果があります。
- 目にしみないやさしい目薬です。
- 無色透明な目薬ですので、衣服についても安心です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4)次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)2週間位使用しても症状がよくなる場合。

効 能

目のかゆみ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のつかれ、結膜充血、目のかすみ（目やにの多いときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は**生後3カ月以上**です。
- (2)容器の先が目やまぶた、まつ毛等に触れると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください（ハードコンタクトレンズにも一部使用できないものがあります）。
- (4)点眼用にのみ使用してください。

成分とそのはたらき

有効成分(100mL中)

成 分	分 量	は た ら き
ネオスチグミンメチル硫酸塩	1mg	目の調節機能を高め、目のつかれを回復します。
アラントイン	100mg	目に生じた小さな傷のなおりを早め、眼病を予防します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg	目のかゆみや炎症をおさえ、充血をしずめます。
ピリドキシン塩酸塩	100mg	目に必要なビタミンB ₆ で、目の新陳代謝を促進します。
タウリン	250mg	目に栄養をあたえ、目のはたらきを正常に保ちます。

添加物としてベンザルコニウム塩化物、ホウ酸、ホウ砂を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限（箱底面及び容器ラベルに西暦年と月を記載）をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911（電話受付時間：月～金（祝日を除く）9：00～17：00）

発売元

MUHI

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

製造販売元

日東メディック株式会社
富山県富山市八尾町保内1-14-1

®登録商標

4CB AA16