

2012年9月 記載要領変更に伴う改訂
使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

第2類医薬品

目薬

パソコン、テレビゲーム…
などによる目の疲れ・充血に

ロートOA 目薬

活性型ビタミンB₂(FAD・Na)配合




パソコン、テレビゲーム…。仕事や気分転換に不可欠でありながら、目の疲れや充血の原因になっています。「白い壁がオレンジ色に見える」、「文字がぼやけて見える」などの症状があらわれたら、明暗順応や調節機能が低下し、目が疲れてきたサインかもしれません。

ロートOA目薬は、活性型ビタミンB₂(FAD・Na)配合。パソコン作業などによる目の疲れ、充血などの不快症状を取り除きます。


「ちょっとひと休み」という時には、**ロートOA目薬**で目も休養させてください。

特長

●3種の成分の効果的な組み合わせで、目の疲れをすっきり取り除きます。



●目の充血、炎症をしずめます。



※ロートOA目薬の黄色い液色は、FAD・Na(活性型ビタミンB₂)によるものです。

△使用上の注意

相談すること



1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみ、痛み

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効 能

目の疲れ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目のかゆみ

用法・用量

1回1～2滴、1日4～5回点眼してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用のみ使用してください。



容器の先と目やまつ毛が
ふれることのないように

成分・分量

有効成分	配合量	有効成分	配合量
フラビンアデニンジスクレオチドナトリウム (FAD・Na)	0.033%	L-アスパラギン酸カリウム	1.000%
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ナファゾリン塩酸塩	0.003%
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.020%		

添加物として、ホウ酸、*l*-メントール、ユーカリ油、ゲラニオール、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7)容器に他の物を入れて使用しないでください。



※薬剤の黄色は衣服についた場合、多少落ちにくいかわかります。あらかじめご注意ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに届きたい」サポートデスクです。
東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230
受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

400023108